



โรคไข้เลือดออก อันตรายจากยุงลาย


โรคไข้เลือดออก เกิดจากติดเชื้อไวรัสแดงที่
มียุงเป็นพาหะนำโรค ไข้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
มีอาการดังนี้



มีไข้สูง
ปวดเมื่อยตัว
ปวดศีรษะ




มีจุดเลือดออก
อาเจียน
ถ่ายเป็นสีดำ



ตับโตมักกดเจ็บ
บริเวณชายโครง
ข้างขวา



ระบบ
ไหลเวียนเลือด
ผิดปกติ
มีภาวะช็อก



อาจพบ
อาการแทรกซ้อน
เช่น ไตวาย
สมองอักเสบ



การรักษาพยาบาล



- ให้ยาพาราเซตามอล
ห้ามใช้แอสไพริน



- ดื่มน้ำมากๆ



- พบแพทย์ทันทีหากมีอาการดังนี้
อาเจียนมาก ปวดท้องมาก มีเลือดออก
ไข้ลด ตัวเย็นผิดปกติ ชี้นิ่ง ไม่ค่อยรู้สึกตัว



การป้องกัน



- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

- สวมเสื้อผ้ามิดชิด

- ใช้ยาทากันยุง

- นอนในที่ปิดมิดชิด



“ด้วยความปรารถนาดี งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรม”